

1.1.8.2. Тювик - *Accipiter brevipes* Gm.

Группа В, Категория 1




Рис. 69. Тювик.
Фото Л.Семаго, 1994

Тювик (*Accipiter brevipes* Gm.) - небольшой ястреб населяющий пойменные и водораздельные широколиственные леса южных районов Европейской части России. Занесен в Красную Книгу России и региональные Красные Книги южных областей России. Внесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС.

Распространение на Урале и прилегающих территориях по литературным источникам.

По данным из Красной Книги России (1983) ареал тювика охватывает юг Европейской части России, северо-западный Казахстан, Украину, Молдавию, Балканы и Малую Азию. По данным А.И.Иванова (1976) севернее Каспия на север тювик распространен по р.Волге до г.Вольска (Саратовская область) и по р.Урал до с.Январцево (Уральская область).

На территории Уральского региона ни кем из исследователей на гнездовании не встречен. Першаков (1929) сообщает о двух случаях добычи тювика под Казанью:

в мае 1910 г. и октябре 1929 г.

В Оренбургской области впервые встречен в начале XX века (Карамзин, 1901), однако гнездование установлено лишь в 80-х годах нашего столетия в долине среднего течения р.Урал (Давыгора с соавт., 1986; Чибилев, 1987; 1995). Наиболее северная находка вида на гнездовании - территория Общего Сырта восточнее Бугуруслана, наиболее восточная - пойма р.Урал выше Оренбурга (Чибилев, 1995).

Статус вида по материалам экспедиционных работ Центра полевых исследований

Распространение, численность и особенности биологии.

Впервые данные о тювике в Уральском регионе были получены в 1991 г. в Челябинской области. 12 июня 1991 г. А.Мошкин обнаружил труп тювика на насыпи ж.д. близ п.Наследницкий Брединского района. Тушка сильно разложилось и в ЦПИ были доставлены лишь крылья и хвост птицы, по которым и сделано определение вида. Визуально в Челябинской области тювик не наблюдался.

В 1994 г. С.В.Быстрых и А.А.Козлов наблюдали тювика с добычей (ящерицей) на южной окраине Стерлибашевского лесного массива (Башкирия).

29 июля 1996 г. на окраине дубравы по западному склону хр.Малый Накас мы наблюдали пару тювиков играющих в воздухе. Здесь же была обнаружена присада птиц, под которой 12 погадок тювика, содержащих остатки ящериц, полевок, белозубок и различных насекомых.

6 июня 1997 г. пара тювиков с явно гнездовым поведением наблюдалась в пойме р.Сакмара близ с.Малоабишево. В течение 3 часов птицы трижды бурно реагировали на коршуна и один раз на могильника, пролетавших вдоль пойменного леса. В связи с лимитом времени нам не удалось прочесать данный участок, чтобы обнаружить гнездо птиц, однако здесь гнездование тювика более чем вероятно. Ближайшее известное место гнездования этого вида находится в пойме Сакмары на территории Оренбургской области ниже г.Кувандык, что в 50 км. ниже по течению. К стати по данным А.Козлова, проходившего всю Сакмару до устья, в пойме этой реки тювик гнездится равномерно, начиная от г.Кувандык по 1 паре на каждые 20 - 30 км.

Мы считаем, что крайний юго-запад Башкирии является северо-восточной границей распространения тювика и, хотя его гнездование здесь до сих пор не установлено, мы считаем его вероятным, на основании встреч пар птиц в гнездовой период и гнездовых находок этого вида в ближайших районах Оренбургской области.