

МАТЕРІАЛЫ

КЪ ПОЗНАНІЮ ФАУНЫ И ФЛОРЫ

РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

ОТДѢЛЪ ЗООЛОГИЧЕСКІЙ.

ВЫПУСКЪ XIV.

Съ 5-ю таблицами.




МОСКВА.

Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о. Пименовскыя ул., соб. д.

1915.

Материалы къ познанію птиц Костромской губ.

Б. Д. Кирпичникова.

ОТЪ АВТОРА.

В 1909 и 1910 года я посвятилъ изслѣдованію орнитологической фауны Костромской губерніи. Мною были посѣщены слѣдующіе уѣзды: Костромской, Буйскій, Галицкій, Нерехтскій, Княшешемскій, Юрьевецкій, Макарьевскій, Кологривскій, Ветлужскій и Варнавинскій; совершенно не обследованными остались Чухломскій и Солигалицкій уѣзды. Сборы производились исключительно лѣтомъ (съ мая до сентября), если не считать какого-нибудь десятка экземпляровъ, которые были добыты въ зимніе мѣсяцы; такимъ образомъ почти вся пролетная фауна осталась совершенно не затронутой мною.

Кромѣ собственной коллекціи, въ моихъ рукахъ были сборы, которые мнѣ любезно предоставилъ г. Волнухинъ (около 50 экзempl.). Такимъ образомъ въ моихъ рукахъ образовалась коллекція въ 480 экземпляровъ, которая и послужила матеріаломъ для настоящей статьи.

Прежде чѣмъ перейти къ фактической части работы, я хочу выразить свою искреннюю благодарность М. А. Мензбину за то содѣйствіе и помощь, которую онъ мнѣ любезно оказывалъ во время моихъ поѣздокъ по Костромской губерніи, и Императорскому Московскому Обществу Испытателей Природы — за предоставленные мнѣ открытые листы.

ВВЕДЕНИЕ.

Общій очеркъ мѣстности.—Дѣленіе птицъ на категоріи по образу жизни.—Объ отношеніи Костромской губерніи къ подраздѣленіямъ Палеарктической области.

Костромская губернія расположена между $56^{\circ}47'$ и $59^{\circ}18'$ сѣверной широты и между $9^{\circ}45'$ — $17^{\circ}22'$ восточной долготы отъ Пулковскаго меридіана. Главной рѣкой Костромской губерніи является Волга, которая протекаетъ по ея южной половинѣ въ направленіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ и дѣлитъ всю площадь на двѣ неравныя части, при чемъ южная или, вѣрнѣе, юго-западная часть является гораздо болѣе населенной, чѣмъ сѣверо-восточная или сѣверная часть. Изъ Волжскихъ притоковъ, начиная съ запада и идя на сѣверо-востокъ по теченію Волги, надо упомянуть слѣдующіе: рѣка Кострома, Немда, Унжа и Ветлуга. Я не перечисляю многочисленныхъ мелкихъ притоковъ и останавливаюсь только на болѣе крупныхъ. Рѣка Кострома вытекаетъ изъ Солигаличскаго уѣзда, гдѣ близъ границы Чухломскаго уѣзда находятся ея истоки; затѣмъ она протекаетъ по Буйскому и Костромскому уѣздамъ; Немда начинается въ Галичскомъ уѣздѣ, затѣмъ протекаетъ по Макарьевскому и здѣсь же впадаетъ въ Волгу; Унжа вытекаетъ изъ Вологодской губерніи и протекаетъ по Кологривскому и Макарьевскому уѣздамъ; Ветлуга начинается въ Вятской губерніи, затѣмъ течетъ по Ветлужскому и Варнавинскому уѣздамъ, при чемъ въ Волгу она впадаетъ уже въ Нижегородской губерніи. Всѣ четыре главныхъ притока впадаютъ въ Волгу съ лѣвой, сѣверной, стороны. Всѣ они имѣютъ большіе поемные луга, частью заросшіе кустарниками. Кромѣ только что перечисленныхъ рѣкъ, слѣдуетъ упомянуть еще р. Вексу, которая соединяетъ Галичское озеро съ р. Костромой. Что касается озеръ, то въ Костромской губерніи мы находимъ два большія озера: Галичское и Чухломское.

Почва Костромской губернии относится къ двумъ главнымъ типамъ: дерново-подзолисту и песчаному. Первый типъ во всѣхъ уѣздахъ занимаетъ первенствующее положеніе; второй распространенъ во всей восточной половинѣ Макарьевского уѣзда по лѣвую сторону течения Унжи, въ юго-восточной части Кологривскаго уѣзда, въ западной Ветлужскаго и въ сѣверо-западной Варнавинскаго. Кромѣ этой главной площади песчаной почвы, которая располагается между рѣками Унжей и Ветлугой и отчасти по лѣвому берегу послѣдней, мы находимъ островки въ Кологривскомъ и Солигаличскомъ уѣздахъ.

Болота распространены главнымъ образомъ въ Ветлужскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, гдѣ они иногда занимаютъ весьма значительныя площади.

Лѣса Костромской губернии еще до сихъ поръ занимаютъ огромныя площади въ сѣверныхъ и восточныхъ уѣздахъ, гдѣ они сливаются со сплошными лѣсами Вологодской и Вытской губернии. Изъ лиственныхъ породъ преобладающее значеніе имѣетъ береза и осина; въ гораздо меньшемъ количествѣ попадаетса ольха, дубъ и пр. Изъ хвойныхъ деревьевъ слѣдуетъ упомянуть сосну, ель, пихту и лиственницу.

Хвойный лѣсъ всюду играетъ первенствующую роль, особенно въ сѣверной и восточной частяхъ нашей губернии.

15. *Mergus merganser*, L.

Mergus merganser, L. Меззбирь, Птицы Россіи, т. I, стр. 604.

Большой крохаль былъ добытъ мною всего одинъ разъ 28.V, по-э-тому трудно говорить о несомнѣнномъ гнѣздованіи этой птицы, такъ какъ этотъ экземпляръ могъ быть и въ числѣ запоздавшихъ пролетныхъ.

Экз. коллекціи: ♂ Ветлужскій уѣздъ, берегъ р. Ветлуги 28.V.10.

Отрядъ Falconiformes.

16. *Pandion haliaëtus*, L.

Pandion haliaëtus, L. Меззбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 5.

Скопа принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Въ южной части губерніи (по правую сторону теченія Волги) это весьма рѣдкая птица, то же надо сказать и о самой Волгѣ. Что касается сѣверной части губерніи, то здѣсь она является гораздо болѣе обыкновенной; особенно много скопъ по рѣкѣ Вексѣ, Галицкаго уѣзда. Вообще надо сказать, что скопа, избѣгаетъ крупныхъ водоемовъ и съ большей охотой поселяется на небольшихъ рѣчкахъ, изобилующихъ рыбой (р. Векса, Немда).

17. *Tinnunculus alaudarius*, Briss.

Tinnunculus alaudarius, Briss. Меззбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 11.

Пустельга является однимъ изъ самыхъ многочисленныхъ соколовъ въ Костромской губерніи. Излюбленными мѣстами пустельги являются рѣчные поймы и доли, гдѣ этотъ сокологъ охотится за мышами и мелкими птицами.

Экз. коллекціи: Кинешемскій у. близъ дер. Назарихи 23.VII.09; ♂ Варнавинск. у. бер. р. Ветлуги 16.VI.10; ♀ Костромск. у., р. Кострома 17.VIII.10.

18. *Erythropus vespertinus*, L.

Erythropus vespertinus, L. Меззбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 22.

Сабанѣвъ указываетъ кобчика для Ярославской губерніи. Мною этотъ сокологъ былъ найденъ только въ западной части Костромской губерніи, близъ границы съ Ярославской, въ Буйскомъ и Костромскомъ уѣздахъ. Но, повидимому, этотъ видъ гнѣздится по всей Кост-

ромской губернии, такъ какъ на востокъ въ губ. Нижегородской онъ также былъ добытъ на гнѣздовѣ (Серебровскій).

Экз. коллекціи: ♀ Костромской уѣздъ. Пойма рѣки Костромы 16.VIII.10 г.

Lithofalco aesalon, Briss.

Lithofalco aesalon, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 30.

М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“ указываетъ дербника, какъ гнѣздящуюся птицу, для слѣдующихъ смежныхъ съ Костромской губерній: Вологодской, Ярославской, Владимірской; г. Серебровскій нашелъ его на гнѣздовѣ въ Нижегородской губернии.

На основаніи этихъ данныхъ надо предполагать, что дербникъ гнѣздится также и въ Костромской губернии, хотя мною этотъ видъ на гнѣздовѣ не найденъ.

19. Falco peregrinus, Briss.

Falco peregrinus, Briss. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 44.

Сапсанъ принадлежитъ къ осѣдлымъ птицамъ Костромской губернии, но всюду встрѣчается рѣдко.

20. Falco subbuteo, L.

Falco subbuteo, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 38.

Чеглокъ является однимъ изъ нашихъ обыкновенныхъ соколовъ. Для своего гнѣзда онъ выбираетъ обыкновенно опушку лѣса. 26.V миѣ удалось наблюдать гнѣздо съ двумя еще не насиженными яйцами; гнѣздо помѣщалось на ели, около 8 сажень отъ земли. Въ іюль и августъ чеглоки въ большемъ количествѣ встрѣчаются по поймамъ рѣкъ, гдѣ и держатся до осенняго отлета.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у., Пелеговская каз. дача, 27.V.09; ♀ Кинешемск. у. близъ дер. Назарихи, 23.VII.09; ♂ Велдужск. у. бер. Велдуги, 31.V.10; Костромск. у. бер. р. Костромы, 17.VIII.10 г.

21. Pernis apivorus, L.

Pernis apivorus, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 74.

Осоѣдъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губернии. Онъ встрѣчается всюду, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ, хотя не можетъ считаться и рѣдкимъ. 27.V.09 г. миѣ удалось найти гнѣздо осоѣда съ двумя слабо насиженными яй-

нами. Гнѣздо помѣщалось на ели на высотѣ 10 сажень отъ земли близь дола.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевск. у. Пелеговская каз. дача 27.V.09; ♀ Кинешемск. у. близь дер. Вандышки 22.VII.09; ♂ тамъ же 13.V.10; тамъ же 27.VII.10; тамъ же 28.VII.10; Варнавинск. у. 19.VI.10; ♀ тамъ же 22.VI.10.

22. *Milvus ater*, Gm.

Milvus ater, Gm. Меназбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 80.

Коршунъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Излюбленными мѣстами для гнѣздованія коршуна являются прибрежныя лѣса, гдѣ эти птицы охотно выютъ свои гнѣзда на высокоствольныхъ деревьяхъ. Молодые вылетаютъ изъ гнѣзда обыкновенно въ началѣ іюля (5-го и 8-го).

Экз. коллекціи: Ветлужск. у. 28.V.10; Кинешемск. у. 12.VII.10 juv; ♂ Костромской у. р. Кострома 19.VIII.10.

23. *Haliaeetus albicilla*, Briss.

Haliaeetus albicilla, Briss. Меназбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 96.

Сабанѣвъ указываетъ бѣлохвоста для Ярославской губерніи. Въ Костромской губерніи мнѣ удалось наблюдать бѣлохвоста всего одинъ разъ въ Макарьевскомъ у. на берегу рѣки Унжи.

24. *Aquila nobilis*, Pall.

Aquila nobilis, Pall. Меназбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 116.

Беркутъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается, какъ и вообще всѣ крупныя птицы, въ довольно ограниченномъ количествѣ. Что касается его распространенія въ нашей губерніи, то я съ увѣренностью могу сказать, что онъ гнѣздится въ слѣдующихъ уѣздахъ: Макарьевскомъ, Кологривскомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Буйскомъ—вообще въ уѣздахъ малозаселенныхъ и изобилующихъ большими лѣсами. За два года изслѣдованій мнѣ удалось найти только одно гнѣздо беркута въ Нейской удѣльной дачѣ, Ветлужскаго уѣзда. Гнѣздо находилось на высокой и толстой (болѣе 3 четвертей въ діаметрѣ) соснѣ среди сосноваго бора вдали отъ устья. Гнѣздо было устроено въ развилкѣ на высотѣ 17 аршинъ отъ земли и имѣло около двухъ аршинъ въ діаметрѣ и

столько же въ толщину. На разстояніи 100—120 сажень отъ этого жилого гнѣзда мнѣ удалось найти другое старое, уже брошенное гнѣздо, которое также помѣщалось на высокой и толстой соснѣ. 6.VI мною были взяты изъ жилого гнѣзда два слабо оперенныхъ птенца, при чемъ одинъ былъ почти въ полтора раза больше другого. Какъ въ гнѣздѣ, такъ и на землѣ подъ гнѣздомъ было много заячьихъ костей, остатки *Sygnium ugalense* и шкурка ежа.

Когда мы подходили къ гнѣзду, то родители, еще издали увидя насъ, поспѣшили улетѣть отъ него, и сколько мы ни подстергали, сколько разъ ни старались тихо подойти къ гнѣзду, они всегда успѣвали замѣтить насъ и скрыться.

Здѣсь я считаю не лишнимъ привести описаніе окраски одного изъ птенцовъ (болѣе крупнаго).

Лобъ темно-коричневый; темя, затылокъ и передняя часть верхней стороны шеи шоколадные, постепенно переходящіе сзади въ темно-коричневый цвѣтъ спины; перья темени и затылка—съ бѣлыми кончиками. Зобъ, грудь и брюхо почти черные. Плюсна бѣлая (пухъ) съ буро-желтыми пестринами; надхвостье и хвостъ (его выросшая, концевая часть) одного цвѣта со спиной; подхвостье и штаны—рыжевато-бурые. Рулевья съ бѣлыми узкими кончиками. Горло, грудь и брюхо покрыты бѣлымъ пухомъ. Пальцы свѣтло-желтые; когти—черные; клювъ черный со свѣтло-синеватыми основаніями верхней и нижней челюстей; восковица зеленовато-свѣтложелтая; радужина орѣховая.

Экз. коллекціи: juv. Ветлужск. у., Нейская удѣльная дача 6.VI.10 (убить 8.VII.10); juv. тамъ же 6.VI.10 (убить 28.VIII.10).

25. *Aquila clanga*, Pall.

Aquila clanga, Pall. Птицы Россіи, т. II, стр. 145.

Въ моей коллекціи нѣтъ ни одного экземпляра большого подорлика, но мнѣ приходилось наблюдать этотъ видъ нѣсколько разъ въ Макарьевскомъ уѣздѣ, одинъ разъ въ Ветлужскомъ и одинъ въ Костромскомъ.

26. *Aquila naevia*, Meyer.

Aquila naevia, Meyer. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 152.

Малый подорлякъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но наблюдался мною только въ западной ея части, въ

Костромскомъ уѣздѣ. 16.VIII мною былъ найденъ цѣлый выводокъ, состоящій изъ двухъ птенцовъ (хорошо летающихъ), самца и самки. Молодые орлята вмѣстѣ съ родителями держались въ прибрежномъ хвойномъ лѣсу, близъ рѣки Костромы; гнѣзда поблизости не было. Здѣсь же (въ Костромскомъ уѣздѣ) мнѣ пришлось наблюдать еще нѣсколько экземпляровъ (3) малыхъ подорликовъ, хотя я не могу сказать съ полной опредѣленностью, что это были экземпляры *Aquila naevia*, а не *Aquila clanga*.

По Сабанѣву въ Ярославской губерніи *Aquila naevia* гнѣздится.

Экз. коллекціи: Костромской у., бер. рѣки Костромы 16.VIII.10.

Circætes gallicus, Gm.

Circætes gallicus, Gm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 196.

О гнѣздованіи змѣеяда у меня нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Я привожу этотъ видъ только потому, что онъ найденъ въ губерніи Нижегородской и возможно, что встрѣчается въ весьма ограниченномъ количествѣ также и въ Костромской.

27. *Archibuteo lagopus*, Brünn.

Archibuteo lagopus, Brünn. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 175.

Зимнякъ принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ. Единственный экземпляръ, находящійся въ коллекціи Волнухина, былъ добытъ изъ пары близъ гнѣзда на опушкѣ березоваго лѣса. Что касается смежныхъ губерній, то въ литературѣ имѣются слѣдующія данныя: М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“ говоритъ, что зимняки отъ времени до времени были добываемы лѣтомъ во Владимирской губерніи; въ Ярославской, по Сабанѣву, зимняки также встрѣчаются и лѣтомъ, и (въ большемъ количествѣ) зимою.

Экз. коллекціи: Нерехтскій у. 30.IV.08.

28. *Buteo vulpinus*, Licht.

Buteo vulpinus, Licht. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 189; *B. vulpinus*, Licht. Мензбиръ, „Орнитологическая географія“. Часть I, стр. 353.

Канюкъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ встрѣчается всюду и всюду является обыкновеннымъ и даже многочисленнымъ. Гнѣздятся конюки по большей части близъ лѣсныхъ опушекъ, хотя мнѣ удалось однажды найти гнѣздо въ са-

мой гущь лѣса вдали отъ опушки. Гнѣздо помѣщалось на высотѣ двухъ саженъ отъ земли, въ промежуткѣ между елью и березой, и имѣло продолговатую форму; длинный діаметръ равнялся аршинѣ. Въ гнѣздѣ находилось (30.V) 4 птенца (пуховыхъ), при чемъ самый крупный изъ нихъ былъ величиною съ дрозда-рябинника.

Изъ 18-ти экземпляровъ, имѣющихся въ моей коллекціи, почти всѣ принадлежатъ къ *B. vulpinus tyricus* (Menzb.), хотя есть и уклоняющіяся формы. Изъ четырехъ старыхъ экземпляровъ три принадлежатъ къ *B. v. tyricus*, а одинъ представляетъ уклоняющуюся форму. Здѣсь я привожу краткое описаніе окраски этого экземпляра. Все опереніе сильно изношенное; общій тонъ окраски свѣтло-бурый. На головѣ отсутствуетъ рыжій налетъ, на спинѣ едва замѣтный, на верхнихъ кроющихъ крыла болѣе значительный. Окраска нижней стороны состоитъ изъ смѣси свѣтло-бурого и бѣлаго цвѣтовъ, за исключеніемъ боковъ шеи, гдѣ перья имѣютъ рыжеватые коемки. Рисунокъ нижней стороны представляетъ въ видѣ продольныхъ свѣтло-бурыхъ пестринъ (у типичныхъ пестрины поперечныя и рыжія). Хвостъ свѣтло-сѣрый съ бурыми поперечными полосами, при чемъ у внутреннихъ опахалъ рулевыхъ свѣтло-сѣрый цвѣтъ болѣе или менѣе замѣненъ бѣлымъ.

Переходя къ молодымъ, я долженъ отмѣтить и остановиться на двухъ темныхъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ приближается къ *B. vulpinus fusco-ater* (Menzb.), а другой представляетъ переходъ къ *B. v. tyricus* отъ темно-бурой формы.

Окраска перваго экземпляра такова: верхняя и нижняя сторона темно-бурая съ рыжеватымъ налетомъ. Перья нижнихъ кроющихъ хвоста съ поперечными рыжими полосами. Хвостъ темно-бурый съ свѣтло-сѣрыми поперечными полосами.

Второй экземпляръ, какъ уже было сказано выше, представляетъ переходъ отъ темно-бурой къ типичной формѣ и характеризуется нѣсколько болѣе темнымъ цвѣтомъ спины и нижней стороны тѣла, при чемъ на послѣдней уже довольно много бѣлаго цвѣта, чего нѣтъ у 1-го экземпляра.

Всѣ остальные относятся къ *B. vulpinus tyricus*, хотя среди нихъ мы и встрѣчаемъ незначительныя варіаціи въ окраскѣ нижней стороны тѣла и рулей.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевскій у., Целеговская каз. дача, 30.V.09; ♀ Кинешемск. у., близъ дер. Вандышка, 14.VI.09; тамъ же,

22.VII.09; Кинешемск. у., близъ дер. Загорье, 28.VII.09; ♂ Кинешемск. у., близъ дер. Вандышка, 31.VII.09; ♂ Макарьевскій у., близъ дер. Чапыги, 9.VIII.09; Макарьевск. у., р. Немда, 13.VII.09; ♀ тамъ же, 14.VIII.09; ♀ Макарьевск. у., дер. Чапыги, 15.VIII.09; ♀ Кинешемск. у., 13.V.10; тамъ же, 15.VII.10; juv. тамъ же, 20.VII.10; juv. тамъ же, 25.VII.10; juv. тамъ же, 25.VII.10; ♀ Галичск. у., р. Векса, 13.VIII.10; тамъ же, 14.VIII.10; Костромской у., 17.VIII.10; juv. Кинешемск. у., 22.VIII.10.

29. *Accipiter nisus*, L.

Accipiter nisus, L. Моназирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 198.

Перепелятникъ распространенъ во всей Костромской губерніи въ качествѣ гнѣздящейся птицы, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ. 12.VII мною были добыты три молодыхъ экземпляра, которые, повидимому, только что покинули гнѣздо; у меня есть также и другія данныя, указывающія, что вылетъ происходитъ въ первыхъ числахъ юля.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 12.VII.10; juv. тамъ же 12.VII.10; juv. тамъ же 12.VII.10; juv. тамъ же 12.VII.10.

30. *Astur palumbarius*, L.

Astur palumbarius, L. Моназирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 205.

Тетереватникъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи и всюду встрѣчается въ незначительномъ количествѣ. 13.V мною было найдено гнѣздо въ сосновомъ бору Спасъ-Красногорскаго лѣсничества Макарьевскаго уѣзда. Гнѣздо помѣщалось на соснѣ, лавшенной вѣтвей, на высотѣ 6-ти сажень отъ земли; въ гнѣздѣ находилась два 3—4-хдневныхъ птенца и два сильно насиженныхъ яйца. Тутъ же была убита и самка, которая вела себя весьма неосторожно.

Экз. коллекціи: ♀ Макарьевскій уѣздъ, Спасо-Красногорское лѣсничество, 13.V.09; Кинешемск. у. 15.X.10; тамъ же 15.X.10; тамъ же 15.X.10.

31. *Circus cineraceus*, Mont.

Circus cineraceus, Mont. Моназирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 217.

Луговой луны принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи и является самымъ обыкновеннымъ изъ нашихъ луней, хотя нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 5.VII.10; Буйскій у., р. Кострома 15.VIII.10.

32. *Circus cyaneus*, L.

Circus cyaneus, L. Меззбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 229.

Полевой лунь распространенъ въ качествѣ гнѣздящейся птицы во всей Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ.

Экз. коллекціи: ♂ Костромской у., р. Кострома 19.VIII.10.

33. *Circus aeruginosus*, L.

Circus aeruginosus, L. Меззбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 235.

Болотный лунь принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но является самымъ малочисленнымъ и рѣдкимъ изъ нашихъ луней.

Экз. коллекціи: ♀ Костромской у., р. Кострома 17.VIII.10.

Отрядъ Galliformes.

34. *Bonasa canescens*, Sparrm.

Bonasa canescens, Sparrm. Меззбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 480.

Рябчикъ—обычная гнѣздящаяся птица Костромской губерніи, но въ большомъ количествѣ встрѣчается только въ сѣверныхъ и восточныхъ уѣздахъ, хотя и тамъ за послѣдніе годы подвергается сильному истребленію. Особенно многочисленны рябчики въ Костромскомъ, Ветлужскомъ, Варнавинскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ, гдѣ онъ является промысловой птицей.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 18.V.09; Макарьевск. у. 8.VIII.09; ♀ Кинешемск. у. 24.VIII.09; ♂ Кинешемск. у. 24.VIII.09; ♂ Ветлужск. у. 1.VI.10.

35. *Tetrao tetrix*, L.

Tetrao tetrix, L. Меззбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 493.

Обычная гнѣздящаяся птица Костромской губ.; особенно многочисленна въ сѣверныхъ, восточныхъ и западныхъ уѣздахъ.

Экз. коллекціи: ♀ Юрьевецкій уѣздъ 25.VI.09; juv. Кинеш. у. 28.VII.09; ♀ Ветлужск. у. 3.VI.10.

75. Alcedo ispida, L.

Alcedo ispida, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 381.

Я наблюдалъ всего одинъ экземпляръ зимородка 27.V.10 г. на рѣкѣ Ветлугѣ въ Ветлужскомъ уѣздѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь зимородки гнѣздятся, хотя и въ незначительномъ количествѣ, такъ какъ въ сосѣдней Нижегородской губерніи они были добыты на гнѣздовѣ г. Серебровскимъ.

76. Glaucidium passerinum, L.

Glaucidium passerinum, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 266.

Говорить что-нибудь определенное о гнѣздованіи сычика въ нашей губерніи я не могу, такъ какъ единственный экземпляръ моей коллекціи былъ добытъ осенью въ октябрѣ. Но въ виду того, что сычикъ найденъ на гнѣздовѣ въ Ярославской (Сабанѣевъ), Вологодской (Мензбирь) и Вятской (Мензбирь) губерніяхъ, можно высказать предположеніе, что онъ гнѣздится также и въ Костромской губ.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. X.09 г.

77. Bubo maximus, Ger.

Bubo maximus, Ger. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 269.

Филинъ принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ гнѣздится по большимъ хвойнымъ лѣсамъ. 30.V мною было найдено гнѣздо въ Макарьевскомъ уѣздѣ близъ р. Шохохты. Гнѣздо помѣщалось на землѣ въ старомъ сосновомъ бору и представляло родъ очень неглубокой ямки на небольшомъ бугоркѣ. Близъ гнѣзда были два пуховыхъ птенца, тутъ же валялась масса заячьихъ костей. Родители вели себя очень осторожно, не подлетая близко къ гнѣзду и держась на значительномъ разстояніи.

Экз. коллекціи: Макарьевск. у., р. Шохохта 30.V.09 (пойманъ), 1.VII.09 (убить); Костромской у., Идоломское оз. 19.X.09.

78. Surnia ulula, L.

Surnia ulula, L. Мензбирь, Птицы Россіи, т. II, стр. 284.

Ястребиная сова принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Мною былъ добытъ всего одинъ экземпляръ въ Кинешемскомъ уѣздѣ 17.VI (молодая самка), на основаніи чего я и заключаю, что ястребиная сова гнѣздится въ нашей

губерніи. За это говорить также и то, что ястребиная сова гнѣздится въ Ярославской (Сабанѣвъ), Вятской (Мензбиръ, „Птицы Россіи“) и Вологодской (Мензбиръ) губерніяхъ.

Экз. коллекціи: ♀ Кинешемск. у. 17.VI.09; тамъ же 15.X.10.

Nyctala tengmalmi, Gm.

Nyctala tengmalmi, Gm. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 290.

Мохноногий сычъ мною не былъ найденъ въ Костромской губерніи. Что касается смежныхъ губерній, то по Мензбиру мохноногий сычъ гнѣздится въ губерніяхъ Ярославской, Вологодской и Вятской, на основаніи чего можно предполагать, что этотъ видъ долженъ встрѣчаться также и въ Костромской губерніи, но мною былъ пропущенъ.

Syrnium lapponicum, Retz.

Syrnium lapponicum, Retz. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 294.

Этотъ видъ мною не найденъ въ Костромской губерніи, но въ виду того, что онъ найденъ на гнѣздовѣ (по Мензбиру, „Птицы Россіи“) въ губ. Ярославской, Вологодской и Вятской, возможно, что онъ гнѣздится также и въ Костромской.

79. *Syrnium uralense*, Pall.

Syrnium uralense, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 297.

Длиннохвостая неясыть была найдена мною въ Костромской губерніи, гдѣ несомнѣнно гнѣздится. То же говорить и М. А. Мензбиръ въ „Птицахъ Россіи“.

Экз. коллекціи: (крыло) Ветлужск. у. 5.V.10.

80. *Syrnium aluco*, L.

Syrnium aluco, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 301.

Сѣрая неясыть принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но нигдѣ не бываетъ многочисленной. Въ моей коллекціи имѣется одинъ экземпляръ неясыти рыжаго типа.

Экз. коллекціи: Кинешемск. у. 15.IV.10.

Nyctea nivea, L.

Nyctea nivea, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 307.

Бѣлая сова мною не найдена въ Костромской губерніи. По утверженію одного мѣстнаго охотника она была встрѣчена имъ зимою въ

Макарьевскомъ уѣздѣ. По Сабанѣву этотъ видъ гнѣздится въ соседней Ярославской губерніи. Г. Серебровскимъ была найдена зимою въ Нижегородской губерніи. На основаніи этого я считаю вполне возможнымъ, что этотъ видъ зимою во время кочевокъ залетаетъ и въ Костромскую губернію.

81. *Asio accipitrinus*, Pall.

Asio accipitrinus, Pall. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 313.

Болотная сова является самой обыкновенной и многочисленной изъ нашихъ совъ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у., дер. Блиново 21.V.09; Кинешемск. у. 12.VI.09; ♂ тамъ же 14.VI.09; ♂ тамъ же 5.VII.09; тамъ же 27.VII.09; ♂ тамъ же 27.VII.09.

82. *Asio otus*, L.

Asio otus, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 318.

Ушастая сова принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи, но встрѣчается значительно рѣже болотной совы.

Экз. коллекціи: ♂ juv. Кинешемск. у. 12.VI.09; тамъ же 5.X.1910.

83. *Caprimulgus europaeus*, L.

Caprimulgus europaeus, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 404.

Козодой принадлежитъ къ обыкновеннымъ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи и всюду встрѣчается въ довольно значительномъ количествѣ.

Экз. коллекціи: ♂ Макарьевск. у. 6.V.09; ♂ тамъ же 7.V.09; ♂ Кинешемск. у. 15.VI.09; ♀ тамъ же 23.VI.09; тамъ же 7.VI.10; ♂ тамъ же 25.VI.10.

84. *Cypselus apus*, L.

Cypselus apus, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 410.

Стрижь является обыкновенной гнѣздящейся птицей Костромской губерніи.

Экз. коллекціи: ♂ Кинешемск. у. 17.V.10; тамъ же 28.VII.10.

85. *Picus martius*, L.

Picus martius, L. Мензбиръ, Птицы Россіи, т. II, стр. 345.

Черный дятель принадлежитъ къ гнѣздящимся птицамъ Костромской губерніи. Онъ всюду обыкновененъ, но нигдѣ не бываетъ многочисленъ.