

Матеріалы къ изученію орнитофауны Нижегородской губерніи.

П. В. Серебровскаго.

Мои наблюденія надъ авифауной Нижегородской губерніи начались съ 1908—909 г., но болѣе систематично велись только въ 1910 и 1911 годахъ. До 1910 г. я коллектировалъ преимущественно въ Нижегородскомъ уѣздѣ, а въ 1910 г. совершилъ нѣсколько экскурсій, продолжавшихся въ общемъ слишкомъ 2 мѣсяца, въ Семеновскій и Макарьевскій уѣзды. Здѣсь я коллектировалъ по Керженцу, начиная почти отъ устья и вверхъ до с. Хахалъ, затѣмъ посетилъ группу большихъ озеръ, лежащихъ приблизительно между Керженцемъ и Ветлугой, гдѣ велъ наблюденія въ окрестностяхъ дер. Красный Яръ (Аниенка тожъ), 22 верстами ниже большого села Воскресенскаго. Въ 1911 году въ теченіе первой половины апрѣля я коллектировалъ въ окрестностяхъ Н.-Новгорода, во вторую же половину этого мѣсяца мною была предпринята поѣздка на лодкѣ внизъ по Волгѣ отъ Н.-Новгорода до с. Бармина (около 120 верстъ). Это путешествіе заняло двѣ недѣли. Во второй половинѣ мая коллектировалъ въ Лукояновскомъ уѣздѣ по р. Алатырю близъ границы Симбирской и Пензенской губ. Въ началѣ іюня и въ первой половинѣ іюля я обслѣдовалъ группу озеръ по р. Серезѣ въ Арзамасскомъ уѣздѣ. Съ 20 іюля и по 5 августа я снова коллектировалъ въ Алатырѣ, на этотъ разъ у самой границы Симбирской губ. Двѣ послѣднихъ трети августа прошли въ экскурсіяхъ на лодкѣ по Волгѣ, преимущественно въ районѣ Жуковскій затонъ — Собчино. Кромѣ этихъ главныхъ экскурсій я, пользуясь каждымъ свободнымъ днемъ, совершалъ менѣе значительныя экскурсіи преимущественно по окрестностямъ Н.-Новгорода и по Волгѣ. Зимой наблюденія велись только въ каникуляр-

ное время и не далѣе окрестностей Н.-Новгорода. Результатомъ экскурсіи явилась коллекція птицъ въ 600 экземпляровъ. Въ Н.-Новгородѣ я при всякомъ удобномъ случаѣ осматривалъ довольно богатый рынокъ, забирая все наиболѣе цѣнное въ научномъ смыслѣ. Часто сносился съ мѣстными охотниками и натуралистами. Изъ послѣднихъ необходимо назвать Н. А. Покровскаго. Онъ занимается изученіемъ флоры и фауны Нижегородской губ. довольно долго и собралъ для Нижегородскаго Земскаго Естественнаго-Историческаго Музея довольно большую и интересную коллекцію птицъ. Эту коллекцію я видѣлъ и въ систематической части буду на нее неоднократно ссылаться. Кромѣ моей коллекціи и музейской, я пересмотрѣлъ нѣсколько другихъ, менѣе значительныхъ. Изъ нихъ упомяну о коллекціи безвременно погибшаго учителя народной школы Суркова, въ которой я видѣлъ добытыхъ въ Семеновскомъ уѣздѣ такихъ рѣдкихъ здѣсь птицъ, какъ *Syrnium lapponicum*, *Nyctala tengmalmi*, *Coracias garrula* и нѣкоторыхъ другихъ. Такимъ образомъ въ моемъ распоряженіи оказался довольно значительный матеріалъ, который я и попытался обработать. Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить благодарность: Императорскому Московскому Обществу Испытателей Природы и профессору Михаилу Александровичу Мензбирову за моральную и матеріальную поддержку, а также профессору Петру Петровичу Сушкину за указанія при составленіи этой работы, Николаю Александровичу Покровскому за предоставленіе мнѣ добытыхъ имъ свѣдѣній и всѣмъ другимъ, кто такъ или иначе способствовалъ моимъ работамъ.

П. Серебровскій.

Списокъ цитированной литературы.

1. М. *Богдановъ*. Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины средней и нижней Волги (біо-географическіе матеріалы). Труды Общества Естественныхъ Испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Т. I. Казань. 1871.

М. А. *Мензбиръ*. Орнитологическая географія Европейской Россіи. Ч. I. Москва. 1882.

3. Dr. М. А. *Menzier*. Die Zugstrassen der Vögel im Europaischen Russland. (Mit 2 Karten). Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. T. LXII. 1886. № 2.

4. *М. Рузскій*. Матеріалы къ изученію птицъ Казанской губерні. Труды Общества Естествениспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Т. XXV, вып. 6. Казань. 1893.

5. *М. А. Мемзбиръ*. Птицы Россіи. Т. I и II. Москва. 1895.

6. *П. П. Сурикинъ*. Птицы Уфимской губерні. Москва. 1897.

7. *М. М. Хомяковъ*. Птицы Рязанской губ. Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отдѣлъ зоологическій. Выпускъ V. Москва. 1901.

8. *С. Алфераки*. Гуси Россіи. 1904.

9. *В. М. Артоболовскій*. Обзоръ птицъ юго-восточной части Пензенской губерні. Предварительное сообщеніе. Кіевъ. 1904.

10. *Б. М. Житковъ и С. А. Бутурлинъ*. Матеріалы для орнитофауны Симбирской губерні. Петроградъ. 1906.

11. *Dr. Ernst Hartert*. Die Vögel der paläarktischen Fauna. H. 1—VII. Berlin. 1903—912.

12. *Г. И. Поляковъ*. Къ орнитологической фаунѣ Московской губерні. Птицы отрядовъ *Pygopodes*, *Longipennes*, *Lamellirostres* и *Steganopodes*. Москва. 1910.

13. *С. А. Рязцовъ*. Матеріалы къ изученію орнитологической фауны Тамбовской губерні. Москва. 1910.

14. *Б. Д. Куртичкиновъ*. Матеріалы къ познанію птицъ Костромской губ. Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отд. зоологическій. Выпускъ XIV. Москва. 1910.

Въ текстѣ систематической части работы вмѣсто названій только что перечисленныхъ трудовъ будутъ обозначаться *только номера*, подъ которыми они внесены въ настоящій списокъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 19.VIII.911 ♀ ad. Жуковский затонъ, Макарьевск. у.
- 2) 27.VIII.911 ♂ juv. ibidem.

94. *Ardea cinerea* (Briss.).

Ardea cinerea, Briss. Мензбиръ. (5), стр. 811.

Сѣрая цапля гнѣздится и очень обыкновенна по Волгѣ и Окѣ. Рѣдко, но также гнѣздится по Керженцу. На Ветлугѣ обыкновенна. Но на озерахъ, лежащихъ между Керженцемъ и Ветлугой я ее не нашелъ. На Серезѣ обыкновенна. По Алатырю гнѣздится, но рѣдка. Весенній пролетъ длится весь апрѣль.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.VII.910 ♀ juv. Окрестн. с. Боръ, Семеновск. у.
- 2) 8.VII.911 juv. Собчинскій затонъ на Волгѣ.
- 3) Весна 1912 г., ad., куплена на нижегородск. рынкѣ.

Raptores.

95. *Pandion haliaëtus* (L.).

Pandion haliaëtus, L. Мензбиръ. (5), стр. 5.

Скопа принадлежитъ къ числу рѣдкихъ, правильно гнѣздящихся птицъ Нижегородской губерніи. Она гнѣздится въ долинахъ Волги и Оки. Сѣвернѣе Волги несомнѣнно гнѣздится по Керженцу и Ветлугѣ и на этихъ рѣкахъ, особенно на послѣдней, она можетъ быть названа обыкновенной. Рѣже гнѣздится по большимъ глухимъ озерамъ Макарьевского уѣзда. Въ южной половинѣ Нижегородской губерніи ея гнѣздовье констатировано для озеръ по Серезѣ. Здѣсь я встрѣчалъ скопъ въ іюнѣ и іюлѣ очень часто. Что касается Ардатовскаго уѣзда, то гнѣздованіе здѣсь скопы представляется очень вѣроятнымъ для Вельтминскаго и Выксунскихъ прудовъ. На Алатырѣ скопа была мною наблюдаема начиная съ 22.VII, иногда парами. Возможно, что она здѣсь гнѣздится. По даннымъ литературы скопа гнѣздится во всѣхъ смежныхъ губерніяхъ, но всюду она рѣдка и только въ Костромской губ. встрѣчаются мѣста, изобилующія этими птицами. На пролетѣ очень обыкновенна на Окѣ и Волгѣ. Весенній пролетъ продолжается до половины апрѣля. Такъ 18.IV.911 на Волгѣ противъ Кетова можно было видѣть пару скопъ высоко летѣвшихъ на NNW.

Экземпляръ коллекціи:

22.VIII.911 ♀ juv. Жуковский заповѣдь на Волгѣ.

96. *Tinnunculus tinnunculus* (L.).

Tinnunculus alaudaris, Briss. Мензбиръ. (5), стр. 11.

Пустельга—самый обыкновенный соколокъ на всемъ протяженіи Нижегородской губерніи. Біологія этой птицы хорошо извѣстна, но не могу не отмѣтить здѣсь одного случая, характеризующаго глупость этой птицы. Мы съ препараторомъ подъѣхали однажды на лодкѣ шаговъ на 30 къ двумъ соколамъ, ♂ и ♀, сидящимъ на деревѣ шаженъ на 5 другъ отъ друга. Я выстрѣломъ изъ ружья убилъ самца, но самка не обратила на это никакого вниманія: продолжала поклевывать какую-то добычу, отряхивала церья и т. п. Когда мы сошли на берегъ и искали убитую птицу шагахъ въ 20 отъ сидящей на деревѣ, эта послѣдняя только перестала клевать, но улетать не собиралась.

Экземпляры коллекціи:

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 1) 27. VI. 909 ♀ ad. | Фроловское, Нижегородскаго уѣзда. | |
| 2) 27. VII. 909 ♀ juv. | ibidem. | |
| 3) 4. VIII. 909 ♂ juv. | Дер. Новосвятителяево, Нижегородск. у. | |
| 4) 5. VI. 910 ♂ ad. | Дер. Рогово, Макарьевского у. | |
| 5) 15. VII. 910 ♀ ad. | Моховыя Горы въ окр. Н.-Новгорода. | |
| 6) 17. VIII. 910 ♀ | | } Хахалы, Семеновскаго уѣзда. |
| 7) 19. VIII. 910 ♂ juv. | | |
| 8) 22. VIII. 910 ♂ juv. | | |
| 9) 24. VIII. 910 ♀ | | } Островъ на Волгѣ противъ Безводнаго. |
| 10) 21. IV. 911 ♀ | | |
| 11) " " ♀ | | |
| 12) " " ♀ | | |
| 13) " " ♂ | | |
| 14) " " ♂ | | |

97. *Hypotriorchis subbuteo* (L.).

Faco subbuteo, L. Мензбиръ. (5), стр. 39.

Чеглокъ—обыкновенная птица описываемой мѣстности. Въ численности уступаетъ пустельгѣ. Первыхъ чеглоковъ здѣсь наблюдали 7. IV. Питается въ большинствѣ случаевъ птичками, но беретъ также мышей и кузнечиковъ. За мышами охотится такъ же, какъ напр., пустельга, т.-е. махая быстро крыльями, удерживается на одномъ мѣ-

стѣ, чтобы получше всмотрѣться. Охотясь за птичками чеглокъ прѣ-
являетъ чисто ястребиныя хватки: быстро летить онъ невысоко надъ
кустами подобно перепелятнику, чтобы напасть на птичекъ врасплохъ.
Никогда не упустить также случая схватить подраненую птицу. Я
наблюдалъ это при такихъ обстоятельствахъ: на обширной площади
топкой грязи держалось много куличковъ рода *Tringa*; по нимъ стрѣ-
ляли ежедневно, но топкая грязь не позволяла всѣхъ подраненыхъ
собирать и поэтому не летающихъ или плохо летающихъ куличковъ
здѣсь держалось всегда много. Въ этомъ же мѣстѣ всегда держались
чеглоки и на моихъ глазахъ охотились за подстрѣленными кулич-
ками, а однажды чеглокъ бросился на раненаго *Tr. alpina* тотчасъ же
послѣ моего выстрѣла по этому кулику.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 2.VII.909 ♀ ad. Дер. Фроловская, Нижегородскаго у.
- 2) " " ♀ juv. ibidem.
- 3) 9.V.910 ♂ Село Лыково-Никольское, Семеновск. у.
- 4) 20.V.911 ♂ Р. Калша, Лукояновскаго уѣзда.
- 5) 4.VI.911 ♀ ad. Старая Пустынь, Арзамасск. уѣзда.
- 6) 4.VII.911 ♀ ad. ibidem.
- 7) 5.VII.911 ♂ ad. ibidem.
- 8) 15.VII.911 ♂ (?) ibidem.
- 9) 18.VIII.911 ♂ Жуковский затонъ на Волгѣ.

98. *Falco peregrinus* (*Tunst.*).

Falco peregrinus, Briss. Меназбиръ. (5), стр. 44.

Сапсанъ на гнѣздовѣ въ Нижегородской губ. пока не найденъ.
Я всего одинъ разъ видѣлъ несомнѣнно эту птицу, а именно:
22.VIII.910 въ окр. Хахаль, Семеновскаго уѣзда. То была старая
птица. Почти полное отсутствіе наблюдений надъ этимъ соколомъ въ
Нижегородской губ. не является случайностью, потому что сапсанъ
рѣдокъ и въ смежныхъ губерніяхъ.

Hierofalco cherrug (*Gray*).

Hierofalco saker, Gmel. Меназбиръ. (5), стр. 53.

Hierofalco sacer, Gmel. Житковъ и Бутурлинь. (10), стр. 234.

Hierofalco cherrug (*Gray*.) Артоболовскій. (9), стр. 13.

Болеѣ, чѣмъ вѣроятно, что балобанъ бываетъ въ южныхъ уѣздахъ
Нижегородской губ., ни чѣмъ по вѣшнему виду не отличающихся

и не отдѣленныхъ естественно границей отъ Симбирской и Пензенской губ., гдѣ балобанъ найденъ. Въ Симбирской, по Житкову и Бутурлину (l. c.), гнѣздованіе балобана констатировано для поймы Алатыря, верстахъ въ 20 отъ границы съ Нижегородской губ., а въ Пензенской губ. по Артоболевскому (l. c.) „балобанъ не рѣдокъ на гнѣздовьяхъ“. Мнѣ эта птица не встрѣчалась.

99. *Erythropus vespertinus* (L.).

Erythropus vespertinus, L. Мензбирь. (5), стр. 22.

Кобчикъ сравнительно рѣдокъ въ Нижегородской губ. Я его встрѣчалъ на гнѣздовьяхъ по одному разу въ Семеновскомъ, Макарьевскомъ и Лукояновскомъ уѣздахъ. Весной—22.IV.910—былъ убитъ въ Балахнинскомъ уѣздѣ близъ ст. „Орловка“ М.-Н. ж. д. Н. А. Покровский встрѣчалъ кобчика осенью въ Васильскомъ уѣздѣ. Осенью попадаетъ чаще, чѣмъ лѣтомъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 21.V.910 ♂ С. Нестіарь, Макарьевского уѣзда.
- 2) 17.VIII.910 ♀ juv. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.

100. *Aesalon aesalon* (Tunstall).

Lithofalco aesalon, Briss. Мензбирь. (5), стр. 30.

Дербникъ встрѣчается еще рѣже, чѣмъ кобчикъ. На гнѣздовьяхъ найденъ мною только въ Семеновскомъ уѣздѣ. Здѣсь я наблюдалъ 9.V.910 парочку этихъ соколовъ подъ Лыковымъ. Въ концѣ августа 23.VIII.910—былъ замѣченъ выводокъ въ количествѣ 4 шт. близъ дер. Арестово, Семеновск. у. Осенью на пролетѣ наблюдался въ Семеновскомъ и Макарьевскомъ уѣздахъ. Н. А. Покровский наблюдалъ въ 1912 году осенью нѣчто подобное пролету этихъ соколовъ въ долинѣ Волги. Имъ и Ф. Ф. Шиллингеромъ между 29.VIII и 8.IX.912 добыто два экземпляра дербниковъ въ этомъ мѣстѣ. Зимой дербника убивалъ (15.XI.905) Н. А. Покровский подъ Н.-Новгородомъ. Въ смежныхъ губерніяхъ найденъ пока только въ Казанской Русскимъ (4).

Экземпляры коллекціи:

- 1) 22.VIII.910 juv. Окр. Хахалъ, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 18.VIII.911 ♂ ad. Жуковский затонъ на Волгѣ, Макар. у.

101. *Pernis apivorus* (L.).

Pernis apivorus, L. Мензбиръ. (5), стр. 74.

Осоѣдъ гнѣздится въ Нижегородской губерніи. У меня имѣются экземпляры изъ Семеновскаго, Нижегородскаго и Лукояновскаго уѣздовъ. Кромѣ того, наблюдавъ въ Макарьевскомъ и Арзамасскомъ. Гнѣздо было найдено мной только однажды—17.V.910 въ Семеновскомъ уѣздѣ. Гнѣздо помѣщалось на высокой елкѣ среди смѣшаннаго съ преобладаніемъ сосны лѣса, саженьяхъ въ 5 отъ земли и содержало 3 почти не насиженныхъ яйца. У гнѣзда убитъ ♂.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 3.VIII.908 ♀ juv. Фроловское, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 17.V.910 ♂ ad. Окр. оз. Чернаго на гран. Семеновск. и Макарьевскаго у.у.
- 3) 31.V.1911 ♀ juv. Пойма Алатыря, Лукояновск. у.
- 4) 4.VIII.911 ♀ juv. Пойма р. Калши, Лукояновск. у.

102. *Milvus ater* (Gm.).

Milvus ater, Gm. Мензбиръ. (5), стр. 80.

Очень обыкновенная птица Нижегородской губ. Гнѣздится всюду, но излюбленное мѣсто ея гнѣздованія—поймы рѣкъ, особенно Волги и Оки. Образъ жизни этого хищника по моимъ наблюденіямъ въ общемъ совершенно таковъ, какъ его описываетъ М. А. Мензбиръ (l. c.).

Весною послѣднюю пролетную стайку, состоящую изъ 3 птицъ, я видѣлъ 13.IV.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 7.V.910 ♀ Лыково-Никольское, Семеновскаго у.
- 2) 21.V.911 ♂ Островъ на Волгѣ противъ Безводнаго.
- 3) 28.V.911 ♀ Р. Алатырь близъ Кемли, Лукояновскаго у.
- 4) 5.VI.911 ♂ Оз. Широкое на р. Серекѣ, Арзамасск. у.

103. *Haliaeetus albicilla* (L.).

Haliaeetus albicilla, Briss. Мензбиръ. (5), стр. 96.

Haliaeetus albicilla (Savigny) Briss. Богдановъ. (1), стр. 32.

Haliaeetus albicilla (Linn.). Рузскій. (4), стр. 140.

Haliaeetus albicilla L. Житковъ и Вутурлянъ. (10), стр. 241.

Haliaeetus albicilla (Linn.). Аргоболевскій. (9), стр. 14.

Haliaeetus albicilla Briss. Кирпичниковъ, (14), стр. 397.

Согласно указаніямъ Мензбира (l. c.) бѣлохвость долженъ встрѣчаться въ центральныхъ губ., а слѣдовательно и въ Нижегородской.

Что касается въ частности Волги, то весьма опредѣленные указанія на гнѣздованіе здѣсь орлана мы находимъ у Эверсмана, Богданова (l. c.) и Рузскаго (l. c.) Последний изъ этихъ авторовъ прослѣдилъ его вверхъ до Суры включительно. Обращаясь къ болѣе позднимъ изслѣдованіямъ фауны центральной Россіи видимъ слѣдующее: Житковъ и Бутурлинь (l. c.) нашли бѣлохвоста въ Симбирской губ. на пролетѣ. По Артоблевскому (l. c.) въ Пензенской губ. гнѣздится. Въ Костромской былъ наблюдаемъ Кирпичниковымъ. Что же касается Нижегородской губ., то о гнѣздованіи здѣсь орлана мнѣ удалось собрать лишь весьма скудные свѣдѣнія. По разсказамъ орланъ гнѣздился въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ старомъ дубовомъ лѣсу противъ Безводнаго на Волгѣ. Въ серединѣ лѣта 15.VII.911 Н. А. Покровский наблюдалъ орлана подъ Василь-Сурскомъ. Весной и осенью нѣсколько разъ наблюдался на Волгѣ. Н. А. Покровскому онъ встрѣчался тамъ даже не особенно рѣдко.

104. *Aquila chrysaëtus chrysaëtus* (L.).

Aquila chrysaetos, L. Мензбирь. (5), стр. 113.

Aquila nobilis, Pall. Мензбирь *ibid.*, стр. 116.

Aquila chrysaetus L. Житковъ и Бутурлинь. (10), стр. 242.

Беркутъ гнѣздится въ Макарьевскомъ, Семеновскомъ и Балахнинскомъ уѣздахъ. Въ Арзамасскомъ я его встрѣтилъ въ гнѣздовую пору однажды, но то была вѣроятно бродячая птица. Въ Лукояновскомъ уѣздѣ беркута можно было ожидать въ поймѣ Алатыря, потому что въ поймѣ этой рѣки въ Ардатовскомъ уѣздѣ, Симбирской губ., недалеко отъ границы съ Нижегородской губ. по свидѣтельству Житкова и Бутурлина (l. c.) беркутъ на гнѣздовѣ обыкновененъ. Однако въ Лукояновскомъ уѣздѣ въ 1911 году я этой птицы не видалъ и пойма Алатыря была занята другими орлами: *Aquila clanga* и *Aquila heliaca*. Такимъ образомъ на гнѣздовѣ беркутъ найденъ пока только въ сѣверной половинѣ Нижегородской губерніи. Въ этомъ районѣ онъ вообще рѣдокъ. Позднею осенью и зимой охотники сѣверныхъ уѣздовъ ловятъ орловъ въ капканы. Отсюда они поступаютъ на нижегородскій и московскій рынки и судя по этимъ рынкамъ беркуты живутъ въ Нижег. губ. круглый годъ. Мнѣ приходилось чаще наблюдать птицъ типа „*A. nobilis* Pall.“ т.-е. молодыхъ и однажды мнѣ былъ присланъ пойманный въ февралѣ 1911 года въ Семеновскомъ уѣздѣ старый *A. chrysaëtus*, L.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 14.XII.910 ♀ ad. Р. Люнда, Макарьевскаго уѣзда.
- 2) 10—20. II.911 ♀ ad. С. Красная Рамень, Семеновск. у.

105. *Aquila heliaca* (Sav.).

Aquila heliaca, Sav. Мензбирь (5), стр. 127.

Могильникъ найденъ гнѣздящимся въ Лукояновскомъ у. 22.VII.911 въ поймѣ Алатыря близъ с. Ичалокъ былъ пойманъ молодой, плохо летающій орленокъ этого вида. 26.VII.911 неподалеку отъ этого мѣста на р. Крутець былъ вынутъ для меня еще одинъ орленокъ. Какъ мнѣ удалось выяснитъ, эти орлята изъ разныхъ гнѣздъ. Лѣсникъ, доставившій мнѣ орленка съ Крутца, рассказывалъ, что орлы гнѣздятся въ этомъ мѣстѣ ежегодно, занимая одно и то же гнѣздо.

Немного поздне—а именно 31.VII.911 въ деревнѣ Нов.-Ичалки моимъ препараторомъ былъ убитъ старый самецъ *A. heliaca* изъ пары. 5.VIII.911 я наблюдалъ пару старыхъ темно-бурыхъ могильниковъ въ окр. той же дер. Въ тотъ день былъ очень сильный дождь и орлы мокрые не охотно взлетали; къ одному я подъѣхалъ шаговъ на 15! Въ Симбирской губ. *Aquila heliaca* Sav. былъ найденъ Рузскимъ въ 1893 году и отнесенъ къ числу случайно залетныхъ (Орнитологическія наблюденія въ Симбирской губерніи М. Рузскаго. Стр. 15). Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что въ то время этотъ орелъ былъ въ Симбирской и сопредѣльной части Нижегородской губ. рѣдкимъ, но въ настоящее время достоверно извѣстно, что онъ гнѣздится въ Симбирской и Пензенской губерніяхъ, такъ что нахождение его въ Нижегородской губ. не является неожиданнымъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 22.VII.911 ♂ juv. Лѣв. берегъ р. Алатыря противъ с. Ичалокъ, Лукояновск. у.
- 2) 26.VII.911 ♂ juv. Рѣчка Крутець, *ibidem*.
- 3) 31.VII.911 ♂ ad. Дер. Нов.-Ичалки, Лукояновск. у.

106. *Aquila maculata* (Gm.).

Aquila clanga, Pall. Мензбирь (5), стр. 145.

Большой подорликъ правильно гнѣздится на протяженіи всей губерніи, выбирая мѣстомъ своего жительства поймы богатыхъ дичью рѣкъ. Къ числу такихъ рѣкъ относятся: Волга, Ока, Ветлуга, Сура, Алатырь и Сережа. На Керженцѣ я его не наблюдалъ совсѣмъ. Не

гнѣздится, повидимому, этотъ орель въ сплошныхъ борахъ сѣверныхъ уѣздовъ и въ бѣдныхъ болотами центральныхъ. Къ имѣющимся даннымъ объ образѣ жизни этой птицы сообщу лишь, что подорликъ, по крайней мѣрѣ въ Нижегородск. губ., насколько мнѣ пришлось наблюдать, кладетъ чаще одно яйцо. Родители не привязаны къ дѣтямъ, и когда подходишь къ гнѣзду, они посѣбно улетаютъ, а орленокъ прижимается къ гнѣзду, молчитъ и вообще старается остаться незамѣченнымъ. У гнѣздъ подорликовъ я находилъ кости утокъ, куръ, карасей и т. п. Во рту одного стараго подорлика, убитаго въ то время, какъ онъ подлеталъ къ своему орленку, я нашелъ около десятка маленькихъ налимовъ, величиною не болѣе огольца. Рыбу подорликъ или ловить самъ, или подбираетъ за рыбаками, въ последнемъ случаѣ онъ противъ обыкновенія подлетаетъ къ людямъ на очень близкое разстоянiе. Отмѣчу поразившее меня умѣнье орлятъ летать. Однажды я у гнѣзда подорликовъ поджидалъ, когда прилетятъ старыя птицы. Находящемуся въ гнѣздѣ, почти совершенно выросшему орленку, надоло лежать прижавшись къ гнѣзду и онъ повемногу сталъ подниматься. Убѣдившись, что я не предпринимаю противъ него враждебныхъ дѣйствiй, онъ сталъ выходить на край гнѣзда, вылѣзать на ближайшiе сучья дерева и т. п. Въ это время мнѣ пришлось выстрѣлить по какой-то птичкѣ. Орленокъ нѣкоторое время сидѣлъ покойно, но вдругъ, расправивъ крылья, соскочилъ съ гнѣзда и полетѣлъ, такъ ловко и быстро лавируя между частыми деревьями, какъ это дѣлаетъ, напр., въ сравненiи съ нимъ маленькая птица—вальдшнепъ.

Экземпляры коллекци:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1) 20.VII.911 ♀ ad. | } | Пойма Калши, лѣвый притокъ Алатыря. |
| 2) 20.VII.911 ♂ juv. | | |
| 3) 26.VII.911 ♀ ad. | | |
| 4) 26.VII.911 ♀ juv. | | |
| 5) 27—28.VII.911 ♀ juv. | | Окр. с. Оброчнаго, Лукояновск. у. |
| 6) 30.VII.911 ♀ ad. | } | Пойма Алатыря, Лукояновск. уѣзда. |
| 7) 31.VII.911 ♂ ad. | | |
| 8) 31.VII.911 juv. | | |

107. *Circaëtos gallicus* (Gm.).

Circaetus gallicus, Gm. Мензбиръ (5), стр. 169.

„ „ „ Мензбиръ (2), стр. 333.

М. А. Мензбиръ въ „Орнитологической географiи“ сообщаетъ: „въ октябрѣ 1880 г. *Circ. gallicus*, пойманный живьемъ въ Нижегород-

ской губернии, доставленъ въ Москву". Тѣмъ же авторомъ въ „Птицахъ Россіи“ (I. с.) сѣверная граница распространенія змѣяда была проведена черезъ Нижегородскую губернію. По моимъ наблюденіямъ змѣядь — рѣдкая гнѣздящаяся птица Нижегородской губ. Вотъ всѣ наблюденія надъ этой птицей: лѣтомъ 1910 г. я видѣлъ змѣяда въ Макарьевскомъ уѣздѣ не далеко отъ р. Арии, притока Керженца. Одновременно и почти тамъ же мнѣ показывали крыло только что убитаго змѣяда. На основаніи рассказовъ можно предполагать, что *Circ. gallicus* гнѣздится въ Семеновскомъ уѣздѣ. 13.VI.910 г. въ лѣсу по Ветугѣ въ окр. дер. Анненки я видѣлъ змѣяда, вылетѣвшаго отъ меня на разстояніи ружейнаго выстрѣла изъ заросшей кустами сырой луговины.

Въ Балахинскомъ уѣздѣ на лѣв. бер. Волги противъ г. Балахны былъ добытъ ♂ змѣядь и доставленъ мнѣ. Такимъ образомъ я считаю вполне доказаннымъ, что *Circ. gallicus* гнѣздится въ сѣверной половинѣ Нижегородской губ., что же касается южной, то и здѣсь змѣядь наблюдался. Лѣтомъ 1908 г. въ Нижегородск. уѣздѣ въ окр. дер. Фроловской мною были найдены три маховыхъ пера этой птицы, а въ 909 г., 20.VIII неподалеку отъ этого мѣста на Кудьмѣ змѣядь былъ добытъ.

Экземпляры коллекцій:

- 1) 20.VIII.909 ♂ (?) ad. P. Кудьма близъ дер. Новой, Нижегород. у.
- 2) 24.IV.910 ♂ Мѣстность „Жары“ противъ Балахны.

108. *Archibuteo lagopus* (Brünn.).

Archibuteo lagopus, Brünn. Мензбиръ (5), стр. 175.

Мохноногій канюкъ бываетъ въ Нижегородской губ. пролетомъ. Возможно, что въ сѣверныхъ уѣздахъ гнѣздится, потому что найденъ на гнѣздовѣхъ близъ плеса, Костромской губ. Волнухинымъ (экземп. я видѣлъ) и былъ убиваемъ лѣтомъ во Владимирской губ. (Мензбиръ (I. с.).

109. *Archibuteo pallidus* (Menzb.).

Archibuteo pallidus, Menzb. Мензбиръ (5), стр. 180.

Сибирскій зимнякъ также бываетъ въ описываемой мѣстности на пролетѣ и, можетъ быть, зимуетъ. Появляется онъ въ центр. губ. сравнительно рано. Напр., въ Симбирской губ. въ началѣ сентября, въ Нижегородск. губ. въ концѣ этого мѣсяца. Такъ 24.IX.898 Archi-

buteo pallidus былъ убитъ подъ Н.-Новгородомъ. У меня имѣется экземпляръ, добытый въ концѣ ноября. На рынкѣ въ Н.-Новгородѣ мнѣ приходилось видѣть ихъ и позднѣе, въ первыхъ числахъ января.

Экземпляръ коллекціи:

25.XI.909 ♂ С. Боръ, Семеновскаго уѣзда.

110. *Buteo vulpinus* (Licht.).

Buteo vulpinus Licht. Мензбиръ (5), стр. 189.

Сарычи—очень обыкновенны въ Нижегород. губ. Ихъ можно наблюдать какъ въ островныхъ лѣсахъ южныхъ уѣздовъ, такъ и въ глухой тайгѣ сѣверныхъ. Въ сѣверныхъ лѣсахъ онъ даже обыкновеннѣе. Тамъ его почти не преслѣдуютъ, а пища изъ ящерицъ, змѣй, мышей, жуковъ, улитокъ всегда въ изобиліи. Прилетаетъ канюкъ въ первыхъ числахъ апрѣля. Въ сѣверныхъ уѣздахъ онъ помѣщаетъ свое гнѣздо на елкѣ или соснѣ всегда невысоко. Яйца, въ количествѣ 2,3 и не особенно рѣдко 4-хъ можно находить въ двадцатыхъ числахъ мая.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) 4.VIII.909 juv. | Дер. Новосвятителево, Нижегородск. у. |
| 2) 28.IV.910 ♂ | Дер. Красный Яршкка, Макарьевскаго у. |
| 3) 6.V.910 ♂ | Рѣчка Арія, притокъ Керженца, Макар. у. |
| 4) 8.V.910 ♀ | Керженецъ у Лыкова, Семеновск. у. |
| 5) 21.V.910 ♀ | С. Нестіаръ, Макарьевскаго у. |
| 6) 14.VIII.910 ♀ | Хахалы, Семеновскаго уѣзда. |
| 7) 19.V.911 ♀ | } Калша, притокъ Алатыря, Лукоян. у. |
| 8) 19.V.911 ♀ | |
| 9) 6.VI.911 ♂ | } Старая Пустынь, Арзамасскаго уѣзда. |
| 10) 8.V.1911 ♀ | |
| 11) 11.VII.911 ♂ | |
| 12) 11.VII.911 ♀ | |
| 13) 20.VII.911 ♀ juv. | } Пойма р. Калши, притока Алатыря, Лукоянскаго уѣзда. |
| 14) 22.VII.911 ♀ juv. | |
| 15) 23.VII.911 ♀ | |
| 16) 4.VIII.911 ♂ ad. | |

111. *Accipiter nisus* (L.).

Accipiter nisus, L. Мензбиръ (5), стр. 198.

Мѣстное названіе: *воробьятникъ*.

Перепелятникъ гнѣздится и не рѣдокъ. Зимой я его не видѣлъ никогда и думаю, что огромное большинство перепелятниковъ откоче-

ывааетъ на зиму южнѣе. Гнѣзда перепелятниковъ я находилъ нѣсколько разъ и всегда находилъ въ нихъ 4 яйца или столько же птенцовъ. Гнѣзда располагались не высоко на деревѣ у ствола, а однажды я нашелъ гнѣздо, устроенное на полѣнницѣ дровъ среди небольшой лѣсной поляны. Сидѣвшая на гнѣздѣ самка подпускала человека шаговъ на 15. Перепелятники охотно держатся въ городахъ, охотятся за воробьями и голубями. Однажды, очевидно, гоняясь за воробьями, молодой перепелятникъ влетѣлъ ко мнѣ въ окно.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 28. V. 910 ♀ Нестіарь, Макарьевского уѣзда.
- 2) 18. VI. 910 ♀ Дер. Анненка на Велтлугѣ въ Макар. у.
- 3) 22. VIII. 910 ♀ juv. С. Сушники, Семеновскаго у.
- 4) 11. IV. 911 ♀ Марьяна Роща въ окр. Н.-Новгорода.
- 5) 14. IV. 911 ♀ Моховыя Горы въ окр. Н.-Новгорода.
- 6) 15. VII. 911 ♀ juv. }
- 7) " " " ♂ juv. } Старая Пустынь, Арзамасск. уѣзда.
- 8) 25. VII. 911 ♀ juv. }
- 9) " " " ♀ juv. } Пойма Калши, Лукояновскаго у.
- 10) " " " ♂ juv. }
- 11) 31. VII. 911 ♀ juv. Пойма Алатыря, Лукояновск. у.
- 12) 28. VIII. 911 ♂ juv. Жуковский затонъ, Макарьевск. у.

Самки отлѣч. цифр. 6, 8, 9 и 11 имѣли парный яичникъ.

112. *Astur palumbarius* (L.).

Astur palumbarius, L. Мензбирь (5), стр. 205.

Истребъ тетереватникъ гнѣздится въ значительно меньшемъ количествѣ, нежели предыдущій видъ. Подъ осень становится болѣе многочисленнымъ. Зимуетъ. Чаще всего охотниками убивается именно тетереватникъ, потому что онъ хватается чучела тетеревей, съ которыми здѣсь охотятся.

Экземпляры коллекціи:

- 1) XI. 910 ♀ ad. Дер. Анненка на Велтлугѣ, Макар. у.
- 2) Конецъ XI. 910 ♀ juv. Нестіарь, Макарьевскаго уѣзда.
- 3) " " " ♀ juv. ibidem.
- 4) 1—5. II. 911 ♀ Красная Рамень, Семеновскаго уѣзда.
- 5) 24. V. 911 ♂ ad. Лѣса во лѣв. бер. Алатыря, Лукоял. у.

113. *Circus cineraceus* (Mont.).

Circus cineraceus, Mont. Мензбирь (5), стр. 217.

Луговой лунь очень обыкновененъ въ долинѣ Волги. Къ сѣверу отсюда, повидимому, рѣдокъ, къ югу — обыкновененъ. Прилетаютъ

луни всѣхъ видовъ въ первой половинѣ апрѣля. Въ это время ихъ особенно много по Волгѣ на поемныхъ лугахъ. Вода, постепенно затопляя луга, вынуждаетъ мышей и полевокъ собираться на островахъ въ большомъ количествѣ. Здѣсь луны находятъ обильную пищу. Ночью на ихъ мѣсто вылетаютъ совы. Осенью луны посѣщаютъ усадьбы и огороды, охотясь за мелкими птичками.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) 23.VII.908 ♂ juv. | Собчинскій затонъ на Волгѣ. |
| 2) 11.VII.911 ♂ juv. | } Окр. Ст.-Шуетми, Арзамаск. у. |
| 3) 11.VII.911 ♀ juv. | |
| 4) 18.VII.911 ♂ juv. | |
| 5) 25.VII.911 ♀ juv. | Пойма Алатыря въ Лукояновск. у. |

114. *Circus macrurus* (Gm.).

Circus macrurus, Gm. Мензбиръ (5), стр. 224.

Среди луней, добытыхъ въ поймѣ Алатыря въ Лукояновскомъ уѣздѣ, оказались два *Circus macrurus* Gm. Оба — молодые самцы. Окраска того и другого замѣтно блѣднѣе окраски *Circus cinerascens* въ соответствующемъ перѣ. Оба имѣютъ типичное для этого вида крыло и болѣе длинную, нежели у *C. cinerascens*, плюсну. Поперечная полосатость надхвостья отсутствуетъ¹⁾. Наиболее надежнымъ признакомъ этого вида является, какъ мнѣ говорилъ проф. П. П. Сушкинъ, размѣръ плюсны. У самцовъ плюсна приблизительно на 8 мм. длиннѣе плюсны ♂ *Circus cinerascens*. Я не знаю, какъ далеко идетъ къ сѣверу *Circus macrurus*, но, вѣроятно, до Волги, за которой начинается уже тайга.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1) 25.VII.911 ♂ juv. | } Пойма Алатыря, Лукояновск. у. |
| 2) 28.VII.911 ♂ juv. | |

115. *Circus cyaneus* (L.).

Circus cyaneus, L. Мензбиръ (5), стр. 229.

Это едва ли не самый многочисленный изъ гнѣздящихся у насъ луней. Прилетаютъ въ первыхъ числахъ апрѣля.

¹⁾ Не поперечная полосатость, а вострица надхвостья — признакъ чрезвычайно измѣчивый индивидуально. Поперечная полосатость же очень характерна для взрослыхъ *C. macrurus*.

Экземпляры коллекціи;

- 1) 27.VII.909 ♂ juv. Дер. Новосвятителево, Нижегородск. у.
- 2) 14. VI. 910 ♀ ad. Дер. Аниенка, Макарьевского уѣзда.
- 3) 24.VIII.910 ♀ juv. Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 4) 25.VII.911 ♀ ad. Дер. Новая Ичалки, Лукояновск. у.

116. *Circus aeruginosus* (L.).

Circus aeruginosus L. Мензбирь (5), стр. 235.

Болотный лунь распространён не вездѣ равномерно. Въ тѣхъ мѣстахъ сѣверной половины Нижегородск. губ., гдѣ мнѣ приходилось коллектировать, я встрѣчалъ его очень рѣдко, тогда какъ по Волгѣ и южнѣ онъ обыкновененъ. Этотъ лунь самый хищный изъ своихъ сородичей. Часто приходилось мнѣ вырѣзывать изъ него сравнительно крупныхъ птицъ, напр., *Vanellus cristatus*. Онъ беретъ и мертвыхъ птицъ. Я знаю случай, когда болотный лунь вытащилъ изъ воды подстрѣленного за день до этого молодого полевого луня (см. № 1 списка полевыхъ луней коллекціи), а однажды я былъ свидѣтелемъ факта, доказывающаго большую смѣлость этого хищника. Я подстрѣлил бекаса и тотъ, отлетѣвъ порядочное разстояніе, упалъ комомъ. Быстро подойти и подобрать бекаса я не могъ, потому что тотъ упалъ среди непролазной топи. Вдругъ, вижу, является болотный лунь и бросается въ траву, куда упалъ бекасъ. Одна минута, и лунь поспѣшно улеталъ съ бекасомъ въ лапашъ.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.VI.909 ♀ ad. Луга на Кудьмѣ близъ дер. Новой, Нижегородск. у.
- 2) 19.IV.911 ♀ Берегъ Волги у Кстова.

Striges.

117. *Athene noctua subsp.?*

Athene noctua, Scop. Мензбирь. (5), стр. 262.

По литературнымъ даннымъ домовый сычъ гнѣздится въ губ. Сибирской, Пензенской и Тамбовской. Несомнѣнно гнѣздится онъ также въ Лукояновскомъ уѣздѣ, Нижегородской губ., гдѣ я не разъ его видѣлъ и слышалъ. Здѣсь онъ довольно обыкновененъ.

118. *Glaucidium passerinum* (L.).

Glaucidium passerinum. L. Мензбиръ. (5), стр. 266.

Добыть лѣтомъ эту птичку мнѣ не удавалось. Весьма возможно, что она здѣсь гнѣздится, такъ какъ была убиваема лѣтомъ подѣ Н.-Новгородомъ; къ сожалѣнію, не сохранилась точная дата. За время отъ 1908 до 1911 г.г. не разъ приходилось мнѣ самому видѣть въ селахъ по вечерамъ сычинокъ и оляжды мнѣ казалось, что я наблюдаю именно этотъ видъ (въ с. Пустыни, Арзамаскаго уѣзда). На пролетѣ бываетъ осенью въ Нижегород. губ., но не знаю насколько правильно. Птицеловы утверждаютъ вполне опредѣленно, что не каждый годъ. Нападаетъ на мелкихъ птичекъ и поэтому при попыткахъ напасть на „кличныхъ“ птицъ птицелововъ часто попадается самъ подѣ сѣти. Въ 1911 г. въ сентябрѣ на Нижегородскомъ рынкѣ было 4 сыча такимъ образомъ пойманныхъ въ окр. города. Насколько мнѣ извѣстно и въ Москвѣ на Трубной площади въ эту осень сычьи были перѣдки.

Экземпляры коллекціи:

- 1) IX.911. Окр. Н.-Новгорода.
- 2) IX.911. *ibidem*.

119. *Bubo bubo* (L.) *typic.* и

120. *B. b. ruthenus* (Buturl. et Zhitk.).

Bubo maximus, Ger. Мензбиръ. (5), стр. 269.

Для Семеновскаго, Балахнинскаго и Макарьевскаго уѣздовъ эта птица, гнѣздящаяся, и особенно зимующая, рѣдкости не представляеть. Что касается центральныхъ уѣздовъ, то здѣсь филинъ, какъ кажется, не гнѣздится: нѣтъ большихъ лѣсовъ; но бываетъ здѣсь весной, осенью и зимой. Я не имѣю свѣдѣній изъ Арзамаскаго и Ардатовскаго уѣздовъ. Въ Лукояновскомъ же несомнѣнно гнѣздится. Молодые филинята были пойманы въ лѣсахъ по Алатырю во второй половинѣ юля 1911 г. Я просмотрѣлъ болѣе десяти зимнихъ (лѣтнихъ не имѣю) филиновъ изъ Нижегород. губ. Типичный (темный) *B. bubo* попался лишь одинъ (№ 1 колл.), остальные въ большей или меньшей степени свѣтлѣе; часто, но не всегда, къ тому же рыжѣе. Эта болѣе свѣтлая, рыжеватая форма описана С. А. Бутурлинымъ и Б. М. Житковымъ въ качествѣ подвида подѣ наз. *B. bubo ruthenus*. Значительная часть филиновъ вполне подходятъ подѣ это описаніе, но много также экземпляровъ переходныхъ къ *B. bubo bubo*.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 1—15.II.910 ♂ Окр. с. Воскресенскаго на Ветлугѣ.
- 2) 20—27.III.911 ♂ Окр. Семенова.
- 3) 19.II.912 ♀ Семеновскій уѣздъ.
- 4) 16.II.912 ♀ Лѣв. берегъ Волги.
- 5) 3.I.913 ♂ Окр. Н.-Новгорода.

121. *Scops scops pulchella* (Pallas).

Scops giu, Scop. Мезѣбирь. (5), стр. 280.

" " " Рузскій. (4), стр. 156.

Scops scops (Linn.) Артоболовскій. (9), стр. 75.

13.V.910 въ окр. с. Лыкова-Никольскаго, Семеновскаго уѣзда я слышалъ крикъ зорьки, а 15.V эта птичка была для меня убита. Въ концѣ мая этого же года зорька была наблюдаема въ одномъ изъ садовъ Н.-Новгорода. Въ маѣ 1911 года крикъ ея былъ слышенъ на лѣв. берегу Волги близъ Жуковскаго затона, Макарьевскаго уѣзда. Очень вѣроятно, что зорька гнѣздится въ Нижегородской губерніи нормально. Что касается соседнихъ губ., то въ Владимирской губ. въ окрестн. Орѣхова-Зуева совка не составляетъ рѣдкости. Въ Казанской и Симбирской губ. она найдена Рузскимъ (l. c.) и по Артоболовскому (l. c.) гнѣздится въ Пензенской губерніи.

Экземпляръ коллекціи:

15.V.910 ♂ ad. Рѣчка Черная, лѣв. притокъ Корженна.

122. *Surnia ulula* (L.).

Surnia ulula, L. Мезѣбирь. (5), стр. 284.

26.V.910 близъ озера Камскаго, Макарьевск. уѣзда, мнѣ удалось близко подойти и рассмотреть эту птицу. Это—единственный случай, когда я наблюдалъ ястребиную сову въ гнѣздовый періодъ. Я причисляю эту птицу къ гнѣздящимся въ сѣверной половинѣ Нижегородской губерніи. За это говоритъ, кромѣ моего наблюденія, также и то, что въ Костромской губ. эта сова была добыта Б. Д. Кирничниковымъ несомнѣнно на гнѣздовѣхъ. Осенью и зимой *Surnia ulula* появляется въ Нижег. губ. въ неодинаковомъ количествѣ. На мѣстномъ рынкѣ въ зиму 909—910 и 910—911 гг. она предлагалась въ большемъ количествѣ, тогда какъ въ 1912—13 г. ея почти не было.

Экземпляръ коллекціи:

25.XI.909 ♂ (?) Окр. с. Борь, Семеновскаго уѣзда.

123. *Nyctala tengmalmi* (Gm.).

Nyctala tengmalmi, Gm. Мензбиръ. (5), стр. 290.

Мохноногий сыч гнѣздится въ Нижегородской губерніи; насколько правильно—судить пока не берусь, потому что выводокъ этого сыча я нашелъ лишь однажды 3.VII.911 въ Арзамасскомъ уѣздѣ близъ с. Старая Пустынь. Изъ выводка добылъ пару молодыхъ. Въ августѣ 1910 г. по селу Хахаламъ, Семеновскаго уѣзда нѣсколько вечеровъ подрядъ леталъ сычъ, по всей вѣроятности *Nyct. tengmalmi*, потому что *Athene* постна здѣсь невѣроятенъ. Н. А. Покровский добывалъ мохноногого сыча подъ Н.-Новгородомъ въ февраль 1905 г.

Экземпляры коллекціи:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1) 3.VII.911 ♀ juv. } | } Стар. Пустынь, Арзамасскаго у. |
| 2) 3.VII.911 ♂ juv. } | |

124. *Scotiaptex cinerea lapponica* (Thunb.).

Syrnium lapponicum, Retz. Мензбиръ. (5), стр. 294.

Гнѣздованья *S. c. lapponica* въ Нижегородской губ. мнѣ не удалось установить. У меня даже нѣтъ свѣдѣній о нахожденіи этой совы въ первую половину осени. Зимой же каменную неясыть добываютъ здѣсь довольно часто. Въ коллекціи нижегородскаго земскаго музея имѣются чучела этой совы; кромѣ того, у любителей и на рынкѣ я видѣлъ каменную неясыть много разъ.

125. *Syrnium uralense* (Pall.).

Syrnium uralense, Pall. Мензбиръ. (5), стр. 297.

Я убилъ эту сову лѣтомъ 1910 г. въ Семеновскомъ уѣздѣ и имѣю основанія думать, что этотъ экземпляръ принадлежалъ къ числу гнѣздящихся въ этой мѣстности. Гнѣздится ли уральская неясыть южнѣе—не знаю, но это болѣе, чѣмъ вѣроятно, потому что эта птица отмѣчается гнѣздящейся въ Пензенской губ. (9). Осенью и зимой длиннохвостая сова одна изъ обыкновенныхъ здѣсь птицъ. Я смотрѣлъ уральскихъ совъ коллекціи проф. П. П. Сушкина изъ Смоленской и изъ Уфимской губ. Птицы Смоленской губ. обычно темнѣе и бурѣе экзempl. изъ Уфимской, но въ той и другой губ. имѣются совы промежуточнаго типа. Нижегородскія (2 экз. моей coll.) сходны съ этими послѣдними.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 19.V.910 ♀ Оз. Черное, Семеновскій уѣздъ.
- 2) 21.XII.909 ♀ Семеновскій уѣздъ.

126. *Syrnium aluco* (L.).

Syrnium aluco, L. Мензбирь. (5), стр. 301.

Syrnium aluco—обыкновенная гнѣздящаяся сова въ предѣлахъ всей губерніи. Ея брачный крикъ можно слышать до половины мая и даже позднѣе. Встрѣчается круглый годъ. Однажды я нашелъ выводокъ этихъ птицъ сравнительно поздно: 7-го іюля. Выводокъ состоялъ изъ 4 уже летающихъ совятъ. Всѣ птицы коллекціи сѣраго типа.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.XI.909 ♂ Окр. с. Борь, Семеновскаго уѣзда.
- 2) 25.XI.909 *ibidem*.
- 3) 7.VII.911 } Стар. Пустынь, Арзамасскаго уѣзда.
- 4) 7.VII.911 }
- 5) 13.V.911 ♀ Марьяна Роща въ окр. Н.-Новгорода.

127. *Nyctea nyctea* (L.).

Nyctea nyctea, L. Мензбирь. (5), стр. 307.

Полярная сова бываетъ по зимамъ въ Нижегородской губ., но не всегда въ одинаковомъ количествѣ и, можетъ быть, даже не каждый годъ.

Экземпляръ коллекціи:

- 1) 19.XII.909 ♀ Село Борисовское, Нижегородскаго уѣзда.

128. *Asio accipitrinus* (Pall.).

Asio accipitrinus, Pall. Мензбирь. (5), стр. 313.

Болотная сова попадалась мнѣ въ описываемомъ районѣ всюду. Несомнѣнно она здѣсь правильно гнѣздится. Питается почти исключительно мышами. Въ желудкѣ одной я нашелъ остатки трехъ большихъ мышей и 5 болѣе мелкихъ и одного жука.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 29.VII.908 ♂ (?) Зеленино, Нижегородскаго уѣзда.
- 2) 10.VIII.908 *juv.* Мокрое, Нижегородск. у.
- 3) 29.VII.909 *juv.* Лѣв. бер. Волги противъ Кстова.
- 4) 17.VIII.910 ♂ Хахалы, Семеновскаго уѣзда.
- 5) 4.VIII.911 ♂ Рѣчка Калша въ Лукояновск. у.

129. *Asio otus* (L.).

Asio otus, L. Мензбирь. (5), стр. 318.

Я встречалъ эту сову почти всюду. Несомнѣнно она очень обыкновенна въ Нижегородской губ. Сплошныхъ боровъ Семеновскаго и Макарьевского уѣздовъ она избѣгаетъ и придерживается перелѣсковъ. Близость полей для нея необходима. Относительно времени гнѣздованія и вылета птенцовъ этой совы, такъ же какъ и предыдущей, мои наблюденія совершенно совпадаютъ съ изложенными въ „Птицахъ Россіи“ Мензбира.

Экземпляры коллекціи:

- 1) 25.V. 909 ♀ ad. Фроловское, Нижегородск. уѣзда.
- 2) 31.V. 909 ♂ juv. ibidem.
- 3) 18.VI. 910 ♂ ad. Дер. Аниенка на Ветлугѣ въ Макар. у.

Picariae.

130. *Coracias garrulus* (L.).

Coracias garrula, L. Мензбирь. (5), стр. 391.

По имѣющимся въ литературѣ даннымъ сизоворонка гнѣздится въ г.г. Казанской, Симбирской, Тамбовской и Владимирской. Въ Нижегородской губ. она была убиваема въ слѣдующихъ уѣздахъ: въ Макарьевскомъ (окр. Покровскаго, Макарьева и Жуковскій затонъ), Семеновскомъ (Лыково-Никольское, Боръ), Васильскомъ (Бармино), Княгининскомъ (Мурашкино), Нижегородскомъ (Фроловская) и Ардатовскомъ (Кулибаки). При этомъ въ пяти изъ указанныхъ пунктовъ (въ Макарьевѣ, Жуковскомъ затонѣ, Барминѣ, Мурашкинѣ и Фроловской) сизоворонка была добыта весной. Лѣтомъ, въ гнѣздовую пору—22.V я наблюдалъ ее однажды въ Лукояновскомъ уѣздѣ (верстахъ въ 18 къ сѣверу отъ селъ: Кемля, Оброчное). Очень цѣнныя наблюденія сдѣлалъ Н. А. Покровскій въ 1899 г. 30.VI въ окрестн. Кулебакъ, Ардатовскаго уѣзда онъ убилъ старую сизоворонку, а въ 1903 г. 16.VII тамъ же наблюдалъ выводокъ этихъ птицъ. Что касается осенняго пролета, то повидимому онъ очень слабъ. Я осенью видѣлъ сизоворонку только однажды: въ началѣ августа въ Нижегородскомъ уѣздѣ (у дер. Зелцына).

Экземпляры коллекціи:

- 1) 16.V. 908 Дер. Фроловское, Нижегородскаго у.
- 2) 26.IV. 911 ♀ Жуковскій затонъ на лѣв. бер. Волги.